



10 XC

PLANT GROWTH REGULATOR SOLUTION

For Use on Container Grown Ornamental Bedding Plants and Plugs

COMMERCIAL

GUARANTEE: paclobutrazol.....4%

REGISTRATION. NO. 31809 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

READ THE LABEL AND THIS BROCHURE BEFORE USING

DANGER CORROSIVE TO EYES

NET CONTENTS: 1 litre

Piccolo® is a registered trademark of Fine Agrochemicals Limited

PRECAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin and clothing. **CORROSIVE** to the eye. **DO NOT** get in eyes.

Wash hands thoroughly with soap and water after using, and before eating, drinking, smoking or using the toilet.

Wear chemical-resistant coveralls over long sleeved shirt and long pants, chemical-resistant gloves, socks and chemical-resistant footwear, goggles or face shield during mixing, loading, application, clean up and repair. When handling plants treated with this product, wear gloves.

If pesticide is spilled on clothing, remove **IMMEDIATELY**. Wash thoroughly and put on clean clothing. Wash work clothing separately from household laundry.

Remove personal protective clothing **IMMEDIATELY** after handling this product. Wash the outside of gloves before removing.

Do not contaminate feed or food.

Do not re-enter the treated area for 12 hours following application.

Avoid spray drift onto other plants.

FIRST AID

IF SWALLOWED: Call a poison control centre or a doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN/CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth if possible.

Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION

Treat symptomatically.

STORAGE

Avoid contamination of seed, feed and foodstuffs. Keep container closed when not in use.

DECONTAMINATION AND DISPOSAL

For information on the disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

CONTAINER DISPOSAL:

FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS:

Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:

1. Triple-or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.

If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

FOR REFILLABLE CONTAINERS:

For disposal, this container must be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this container for any other purpose.

If the container is not being refilled, refer to the section "FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS".

ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

NOTICE TO USER

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

GENERAL INFORMATION

- Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution is a plant growth regulator for use on commercially grown ornamental plants grown in containers in nurseries and greenhouses.
- Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution reduces internode elongation, resulting in more desirable compact plants.
- Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution produces no phytotoxic effects when used as directed.
- Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution can be applied as a foliar spray or soil drench.

The efficacy of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution is affected by environmental and cultural conditions. Conditions causing vigorous growth require higher rates of application of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution to achieve the desired effect. Temperature is particularly important in this respect.

Response to Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution varies with species and variety.

DIRECTIONS FOR USE

DO NOT REUSE POTS, TRAYS, OR OTHER CONTAINERS THAT PREVIOUSLY HELD PLANTS OR SOIL TREATED WITH PICCOLO 10 XC PLANT GROWTH REGULATOR SOLUTION

DO NOT allow effluent or runoff from greenhouses containing this product to enter lakes, streams, ponds or other waters.

MIXING INSTRUCTIONS

Half fill the spray/drenching tank with clean water. Accurately measure out the required amount of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution according to Table 1. Add the Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution to the spray tank and fill the tank with the remaining required amount of water to achieve the correct concentration.

Table 1. Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution Dilution Table

Concentration of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution Desired (ppm*)	Milliliters (mL) of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution required		
	per Litre of water	per 10 Litres of water	per 100 Litres of water
1	0.025	0.25	2.5
2	0.05	0.50	5.0
3	0.075	0.75	7.5
4	0.10	1.0	10.0
5	0.125	1.25	12.5
6	0.15	1.5	15.0
7	0.175	1.75	17.5
8	0.20	2.0	20.0
9	0.225	2.25	22.5
10	0.25	2.5	25.0
15	0.375	3.75	37.5
20	0.50	5.0	50.0
25	0.625	6.25	62.5
30	0.75	7.5	75.0
40	1.0	10.0	100.0
50	1.25	12.5	125.0
60	1.5	15.0	150.0

*parts per million

APPLICATION TECHNIQUES

Ensure that your application rate calculations, volume measurements and sprayer calibration are accurate prior to application.

Frequent agitation of the spray mixture is essential.

Spray Application

When applying Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution by spray it is important that:

The spray does not drift on to other plants.
Sufficient water volume is used to thoroughly wet plant stems.

Excessive spray solution is not applied as Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution is active through both root and stem uptake by the plant.

Uniform coverage of all plants is achieved.

A period of at least 30 minutes is allowed after application before overhead irrigation occurs.

Sequential applications of half the recommended application rate 7-10 days apart can provide more uniform growth effects and also prevent excessive plant growth regulation. This is particularly important when cooler temperatures or lower light conditions occur.

Generally the spray volume for small plants in small containers or plug trays which are closely spaced is 1-2 litres per 10 square metres of bench area. For larger plants with a well-developed canopy, the spray volume is approximately 3 litres per 10 square metres of bench area.

Drench Application

Drench applications of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution tend to be the most effective in reducing plant height and producing a uniform effect. Drench applications can be made without phytotoxic effects late in the growing cycle, at or near the point that marketable size is reached.

When applying Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution by drench, it is important that:

Application is made to moist potting media.

Uniform distribution of the drench solution is achieved.

No more than 10% run through of solution occurs.

Regard is paid to the growing media. Media containing bark or of high organic content may require the use of higher application rates.

When applied as a drench through sub-irrigation in saucers or benches etc., reduce rates by 25-50%.

When continuously applied through irrigation water, reduce the rate used to 5-25% of a single conventional drench application.

Table 2 provides a guide to determining the appropriate drench volume required for the specific pot size based on a 15 cm diameter "Azalea" type pot. Individual pots may vary in style and depth and thus capacity. Growers must determine the appropriate concentration and volume of drench to apply according to the pot media and species/variety of the plant considered.

Table 2. Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution Drench Volume Guidelines

Pot Diameter (cm)	Drench Volume (ml per pot)	Paclobutrazol per pot (mg/pot)	
		0.5 ppm	1 ppm
10	60.0	0.030	0.060
12.5	90.0	0.045	0.090
15	120.0	0.060	0.120
20	300.0	0.150	0.300
25	740.0	0.370	0.740

DETERMINING OPTIMUM RATES

Optimum Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution application rates will vary between growers and will depend upon the desired final plant height, growing conditions, application techniques, species and variety or cultivar. Growers should conduct trials with small numbers of plants of a particular genera/species or variety using rates within the recommended label rate range to determine application rate for their situation, before Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution is applied to a large number of plants. Growers may find that they have to adjust application rates, techniques, timings and treatment periods to achieve the desired effect. DO NOT apply rates of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution higher than those indicated on this label for a particular species.

Bedding Plants

Refer to Table 3 “Suggested Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution Spray Application” for application rates for specific bedding plant species.

Apply at any stage of growth with good stem coverage, especially for vigorous varieties.

High rates of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution may delay flowering especially of impatiens and petunia.

Late application and overdosing may cause slow growth on transplantation. This can be avoided by multiple applications of 25-50% of the specified rate and monitoring plant growth.

Application just prior to transplanting, or use of single applications at the maximum rate may result in excessive growth reduction and delay in transplant establishment. Excessive growth reduction can be avoided with the use of multiple applications of 25-50% of the specified rate in conjunction with the monitoring of plant growth to determine the requirement for treatment.

For drench application (not specified in Table below), apply Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution at a rate of 0.5 to 1.0 ppm in the volume indicated for the pot diameter indicated in Table 2. “Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution Drench Volume Guidelines”.

Table 3. Suggested Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution Spray Application on Bedding Plants

Plant	Rate Range (ppm)
Begonia cellpack	1-2 ppm at 200 mL/m ²
Calibrachoa cellpack	100 ppm at 200 mL/ m ² 2-4 ppm (drench)
Celosia cellpack	20-40 ppm at 200 mL/m ²
Coleus cellpack	20-40 ppm at 200 mL/m ²
Geranium 10 cm pot	5-15 ppm at 200 mL/ m ²
Impatiens cellpack	6 – 12 ppm at 150 mL/ m ²
Impatiens plugs	1 – 6 ppm at 150 mL/ m ²
Penstemon pot	200 ppm at 200 mL/ m ² 8 ppm (drench)
Petunias cellpack	30 – 60 ppm at 200 mL/ m ²
Petunias 10 cm pot (drench)	0.5-1.0 ppm at 60 mL/pot
Salvia cellpack	20 – 40 ppm at 200 mL/ m ²

Bedding Plant Plugs

Drench applications are not recommended for bedding plant plugs.

When assessing optimum rates, growers should pay particular attention to how treated plants grow after transplanting to avoid overdosing.

Herbaceous Perennials

Apply Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution as a spray or drench to a wide variety of herbaceous perennial plants.

Refer to Table 4 “Suggested Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution Spray and Drench Application” for application rates for specific perennial plant species. Apply at any stage of growth with good stem coverage, especially for vigorous varieties.

Table 4. Suggested Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution Spray and Drench Application on Herbaceous Perennial Plants

Plant	Spray Rate (ppm)	Drench Rate (ppm)
Chrysanthemum	50 - 200	1 - 4
Cosmos	-	5
Coreopsis	80 - 100	5 - 10
Gaura	100 - 200	30
Hypericum Calycinum	80 - 160	1 - 8
Lantana camara	20 - 40	2
Marigold	90	5
Monarda	60 - 160	8
Verbena	120 - 160	1 - 3
Veronica	80 (not to exceed 80 ppm)	4 - 8

Pot Sunflowers

Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution can be applied as a drench to pot sunflowers.

Use 1 – 4 ppm for drench applications to sunflowers grown in 15 cm pots to reduce plant height and width.

Penstemon

Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution can be applied by spray, or drench to Penstemon. Use a solution containing a concentration of active ingredient of up to 200 ppm for spray application, and up to 64 ppm for drench application to Penstemon for the reduction of plant height and width.

Geraniums

Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution can be applied as a spray to geraniums.

Use 5 – 15 ppm at 200 mL/m² for spray applications to geraniums grown in 10 cm pots.

Applications for zonal geraniums should begin when new growth is 3.5 to 5 cm long. Applications for seeded geraniums should begin at 2-4 weeks after transplanting or when necessary.

Geranium species are extremely sensitive to Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution treatment. Growers must be cautious and conduct trials before applying Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution.

Early applications may require lower rates to avoid overdosing.

Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution will reduce late stretches when applied as the flower stems begin to elongate.

Poinsettias

Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution can be applied as a spray or drench to poinsettias.

Spray Applications

Use concentrations of 10 – 30 ppm for spray applications.

Applications to slower growing varieties should begin when axillary shoots are 5 to 7.5 centimeters long. For vigorous growing varieties, earlier applications can be made. Sequential applications may be applied 1 to 3 times, applying approximately the same amount of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution in total as a single recommended dose, at 7 to 14 day intervals, depending on the plant vigor/growth.

Late sprayed applications of Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution will reduce plant height but may also reduce bract size. Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution should not be sprayed after the initiation of short days. Generally, do not apply Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution sprays after October 1.

Drench Applications

Use concentrations of 0.25 – 3 ppm for drench applications (based on 120 ml per 15 cm pot). Early production applications should be made when axillary shoots are 4 to 8 centimeters long. Late drench applications can safely be made after initiation of short days to prevent late stretch with minimal effect on bract size.

- Single applications at the higher rates are very effective but sequential applications tend to produce more uniformly shaped plants and also guard against overdosing.
- Optimum Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution rates and timings will vary depending on the variety.

Pot Chrysanthemums

Piccolo 10 XC Plant Growth Regulator Solution can be applied to pot chrysanthemums as a spray or drench.

Use concentrations of 50 – 200 ppm for spray applications and 1 - 4 ppm for drenches. Applications should begin when axillary shoots are 5 to 7.5 centimeters long. Earlier applications can be made to vigorous varieties.

- When spraying, sequential applications of reduced rates tend to product more uniformly shaped plants.
- If late treatment is required at disbud, minimal effect on flowering will occur if drench applications are used.
- Uniform application of both sprays and drenches is critical to uniform crop development.

FINE AGROCHEMICALS LIMITED

Hill End House, Whittington
Worcester WR5 2RQ
United Kingdom

Distributed by:
N.M Bartlett Inc.
4509 Bartlett Road
Beamsville, Ontario
L0R 1B1
905-563-8261

Piccolo® is a registered trademark of Fine Agrochemicals Limited

PMRA 9/29/15

SPECIMEN



10 XC

RÉGULATEUR DE CROISSANCE DES PLANTES EN SOLUTION

Pour utilisation sur les plantes ornementales de parterre cultivées en contenants et des plateaux multicellules

COMMERCIAL

GARANTIE: paclobutrazol.....4%

N° D'HOMOLOGATION 31809 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE AVANT L'EMPLOI
DANGER CORROSIVE POUR LES YEUX**

CONTENU NET : 1 L

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Produit nocif s'il est absorbé par la peau. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. **CORROSIVE** pour les yeux. **ÉVITER** tout contact avec les yeux.

Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après l'utilisation du produit et avant de manger, boire, fumer ou utiliser les toilettes.

Porter une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long; des gants résistant aux produits chimiques; des chaussures résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des lunettes de protection ou un écran facial pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations. Porter des gants pour manipuler les plantes traitées avec ce produit.

Si le produit est renversé sur les vêtements, les enlever **IMMÉDIATEMENT**. Se laver à fond et enfiler des vêtements propres. Laver les vêtements de travail séparément de la lessive ménagère.

Enlever les vêtements personnels protecteurs **IMMÉDIATEMENT** après la manipulation du produit. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever.

Ne pas contaminer les aliments pour humains ou animaux.

Ne pas retourner sur les lieux traités durant les 12 heures suivant le traitement.

Éviter toute dérive de la pulvérisation vers les autres plantes.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE

Ne pas contaminer les semences ni les aliments pour humains ou animaux. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi pour le nettoyage des déversements.

ÉLIMINATION DU CONTENANT:

ÉLIMINATION DES BIDONS DE PLASTIQUE:

Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

POUR LES CONTENANTS À REMPLISSAGES MULTIPLES:

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

Si ce contenant ne doit pas être rempli à nouveau, consulter la section "ÉLIMINATION DES BIDONS DE PLASTIQUE".

PRÉCAUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT

NE PAS contaminer les approvisionnements en eau d'irrigation ou potable ou les habitats aquatiques par le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution est un régulateur de croissance des plantes pour une utilisation sur les plantes ornementales cultivées commercialement dans des contenants en pépinières et de serres.
- PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution réduit l'allongement internodal, ce qui produit des plantes plus compactes et attrayantes.
- PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution n'a aucun effet phytotoxique lorsqu'il est utilisé selon les directives.
- PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution peut être appliqué en pulvérisation foliaire ou par arrosage du pied.

Les conditions environnementales et culturelles affectent l'efficacité du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution. Les conditions favorisant une croissance vigoureuse nécessitent l'application du produit à des doses plus élevées pour obtenir les résultats désirés. La température est particulièrement importante à cet égard.

La réponse des plantes au PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution varie fortement selon les conditions de croissance et l'espèce.

MODE D'EMPLOI

NE PAS RÉUTILISER LES POTS, PLATEAUX OU AUTRES CONTENANTS DANS LESQUELS ONT ÉTÉ CONSERVÉS LES PLANTES OU LES SOLS TRAITÉS AU MOYEN DU PICCOLO 10 XC RÉGULATEUR DE CROISSANCE DES PLANTES EN SOLUTION.

EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des serres d'atteindre les lacs, les cours d'eau, les étangs ou tout autre plan d'eau.

DIRECTIVES POUR LE MÉLANGEAGE

Remplir à moitié le réservoir de pulvérisation ou d'arrosage avec de l'eau propre. Mesurer exactement la quantité nécessaire de PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution selon le tableau 1. Ajouter au réservoir le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution, et remplir le reste du réservoir avec de l'eau, de façon à obtenir la concentration désirée.

Tableau 1. Dilution du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution

Concentration désirée du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution (ppm*)	Millilitres (mL) requis du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution		
	par litre d'eau	par 10 litres d'eau	par 100 litres d'eau
1	0,025	0,25	2,5
2	0,05	0,50	5,0
3	0,075	0,75	7,5
4	0,10	1,0	10,0
5	0,125	1,25	12,5
6	0,15	1,5	15,0
7	0,175	1,75	17,5
8	0,20	2,0	20,0
9	0,225	2,25	22,5
10	0,25	2,5	25,0
15	0,375	3,75	37,5
20	0,50	5,0	50,0
25	0,625	6,25	62,5
30	0,75	7,5	75,0
40	1,0	10,0	100,0
50	1,25	12,5	125,0
60	1,5	15,0	150,0

* parties par million

MODE D'APPLICATION

S'assurer de la justesse des calculs, des volumes mesurés et de l'étalonnage du pulvérisateur.

Il est essentiel d'agiter fréquemment la solution de pulvérisation.

Application par pulvérisation

Lors de la pulvérisation du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution, il est important de se rappeler ce qui suit:

Éviter la dérive des embruns de la solution sur les autres plantes.

Le volume d'eau doit être suffisant pour saturer la tige des plantes.

Ne pas appliquer en quantité excessive car les plantes absorbent le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution à la fois par les racines et par la tige.

Assurer une application uniforme pour toutes les plantes traitées.

Un intervalle d'au moins 30 minutes suivant l'application doit s'écouler avant que ne débute toute irrigation sur frondaison.

Des applications séquentielles à mi-dose faites de 7 à 10 jours d'intervalle peuvent procurer une croissance plus uniforme et éviter une régulation excessive de la croissance des plantes. Cela est particulièrement important lorsque les températures sont fraîches ou que l'ensoleillement est faible.

La dose à pulvériser sur les petites plantes croissant dans de petits contenants ou dans des plateaux multicellules rapprochés est habituellement de 1 à 2 litres par bloc de 10 mètres carrés. Pour les plantes plus grandes ayant un couvert dense, la dose est d'environ 3 litres par bloc de 10 mètres carrés.

Arrosage du Pied

L'arrosage du pied avec le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution constitue souvent la méthode la plus efficace de réduire la hauteur des plantes et de produire une croissance uniforme. L'arrosage du pied peut se faire sans effet phytotoxique à la fin du cycle de croissance, lorsque la plante arrive à sa taille de mise en marché.

Lors de l'application du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution par arrosage du pied, il est important que:

Le produit soit appliqué sur le terreau mouillé.

La solution d'arrosage soit uniformément épanchée.

Le ruissellement de la solution ne dépasse pas 10 %.

La composition du terreau soit prise en considération. Si le terreau contient de l'écorce ou une forte proportion de matière organique, une dose plus élevée peut s'avérer nécessaire.

La dose soit réduite de 25 à 50 %, lorsque l'arrosage du pied se fait par sub-irrigation dans des soucoupes ou des bassins, etc.

La dose ne soit que de 5 à 25 % de l'habituelle dose unique d'arrosage du pied, lorsque le produit est continuellement appliqué par irrigation.

Le tableau 2 constitue un guide pour déterminer la quantité de produit que requiert l'arrosage du pied, selon la dimension particulière du pot (en fonction d'un pot de type «azalée» d'un diamètre de 15 cm). Les divers pots peuvent varier tant en style qu'en profondeur, et donc en capacité. Les producteurs doivent déterminer la concentration appropriée et le volume de solution à appliquer selon le type de terreau et l'espèce ou variété de plantes à traiter.

Tableau 2. Lignes directrices pour appliquer par arrosage du pied le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution

Diamètre du pot (cm)	Quantité de solution (mL par pot)	Paclobutrazol par pot (mg/pot)	
		0,5 ppm	1 ppm
10	60.0	0.030	0.060
12.5	90.0	0.045	0.090
15	120.0	0.060	0.120
20	300.0	0.150	0.300
25	740.0	0.370	0.740

DÉTERMINATION DES DOSES OPTIMALES

Les doses optimales pour l'application du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution varient d'un producteur à l'autre, ainsi que selon la hauteur finale désirée, les conditions de croissance, les méthodes d'application et l'espèce, la variété ou le cultivar. Avant d'appliquer le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution à un grand nombre de plantes, les producteurs doivent faire des essais sur un petit nombre de plantes d'une espèce, d'une variété ou d'un cultivar particulier auxquelles ils appliquent alors l'éventail de doses recommandées sur l'étiquette afin de déterminer le taux d'application approprié à leur situation. Les producteurs peuvent constater qu'ils doivent ajuster les doses d'application, les méthodes, les horaires et les périodes de traitement pour obtenir l'effet désiré. NE PAS appliquer une dose de PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution qui serait supérieure à celles indiquées sur cette étiquette pour une espèce particulière.

Plantes de Parterre

Pour les taux applicables aux diverses espèces de plantes de parterre, consulter le tableau 3 «Doses suggérées pour la pulvérisation du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution sur les plantes de parterre».

Appliquer à toute étape de la croissance en humectant à saturation les tiges, spécialement pour les variétés vigoureuses.

Les doses élevées de PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution peuvent retarder la floraison, particulièrement pour les impatientes et les pétunias.

Une application tardive ou le surdosage peut causer une réduction de la croissance lors de la transplantation. On peut éviter une réduction de la croissance en combinant plusieurs applications de 25 à 50% de la dose recommandée avec un suivi rigoureux de la croissance.

L'application juste avant la transplantation ou une seule application à la dose maximale peut causer une réduction excessive de la croissance et retarder l'établissement de la plante en question. On peut éviter une réduction excessive de la croissance en combinant plusieurs applications de 25 à 50 % de la dose recommandée avec un suivi rigoureux de la croissance pour déterminer le moment approprié du traitement.

Lors d'un arrosage du pied (n'est pas mentionné dans le tableau ci-dessous), appliquer le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution à la dose de 0,5 à 1,0 ppm selon le volume indiqué pour le diamètre du pot au tableau 2 «Lignes directrices pour appliquer par arrosage du pied le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution».

Tableau 3. Doses suggérées pour la pulvérisation du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution sur les plantes de parterre

Plante	Plage des doses (ppm)
Bégonias en caissette	1-2 ppm à 200 mL/m ²
Calibrachoa en caissette	100 ppm à 200 mL/ m ² 2-4 ppm (arrosage du pied)
Célosies en caissette	20-40 ppm à 200 mL/m ²
Coléus en caissette	20-40 ppm à 200 mL/m ²
Géraniums en pot de 10 cm	5-15 ppm à 200 mL/m ²
Impatientes en caissette	6-12 ppm à 150 mL/m ²
Impatientes en plateau multicellules	1-6 ppm à 150 mL/m ²
Penstemon en pot	200 ppm à 200 mL/ m ² 8 ppm (arrosage du pied)
Pétunias en caissette	30-60 ppm à 200 mL/m ²
Pétunias en pot de 10 cm (arrosage du pied)	0,5-1,0 ppm à 60 mL/pot
Salvias en caissette	20-40 ppm à 200 mL/m ²

Plateau multicellules de plantes de parterre

L'arrosage du pied n'est pas recommandé pour les plantes de parterre en plateau multicellules

Pour déterminer les doses optimales et éviter ainsi toute surdose, les producteurs doivent accorder une attention particulière à la façon dont les plantes traitées croissent après la transplantation

Vivaces Herbacées

Appliquer PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution par pulvérisation ou par arrosage du pied à une grande variété de plantes vivaces herbacées.

Reportez-vous au Tableau 4 «Suggérée Piccolo 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution pulvérisation et l'application par arrosage» pour les taux d'application pour les espèces de plantes vivaces spécifiques. Appliquer à n'importe quel stade de la croissance avec une bonne couverture de la tige, en particulier pour les variétés vigoureuses.

Tableau 4. Suggérée PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution Pulvérisation et l'Application par Arrosage

Plante	Taux pour Pulvérisation (ppm)	Taux pour Arrosage (ppm)
Chrysanthemum	50 - 200	1 - 4
Cosmos	-	5
Coreopsis	80 - 100	5 - 10
Gaura	100 - 200	30
Hypericum Calycinum	80 - 160	1 - 8
Lantana camara	20 - 40	2
Marigold	90	5
Monarda	60 - 160	8
Verveine	120 - 160	1 - 3
Veronica	80 (ne doit pas dépasser 80 ppm)	4 - 8

Tournesol de Pot

PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution peut être appliqué par arrosage du pied sur les tournesols de pot.

Utiliser 1 - 4 ppm pour l'arrosage de tournesols cultivés en pots de 15 cm de réduire la hauteur de la plante et largeur.

Penstemon

PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution peut être appliqué par pulvérisation ou par arrosage du pied à Penstemon.

Utiliser une solution contenant une concentration de l'ingrédient actif allant jusqu'à 200 ppm pour application par pulvérisation, et jusqu'à 64 ppm pour le traitement par arrosage du pied à Penstemon pour la réduction de la hauteur et la largeur de la plante.

Géraniums

Le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution peut être pulvérisé sur les géraniums.

Utiliser de 5 à 15 ppm à la dose de 200 mL/m² pour la pulvérisation sur le géranium cultivé en pot de 10 cm. L'application sur le géranium zonal devrait débuter lorsque la nouvelle croissance atteint de 3,5 à 5 cm. L'application sur le géranium semé devrait débuter de 2 à 4 semaines après la transplantation ou au besoin.

Le géranium est extrêmement sensible au PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution. Les producteurs doivent être prudents et faire des essais avant d'appliquer le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution.

Une application précoce peut nécessiter une plus faible concentration afin d'éviter une surdose.

Le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution réduit les poussées tardives lorsqu'il est appliqué au moment où la tige de la plante commence à allonger.

Poinsettias

Le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution peut être appliqué par pulvérisation ou par arrosage du pied sur poinsettias.

Application par pulvérisation

Employer des concentrations de 10 - 30 ppm pour des applications par pulvérisation.

Les applications sur des variétés à croissance plus lente devraient commencer quand les pousses axillaires ont de 5 à 7.5 centimètres de long. Pour des variétés à croissance vigoureuse, des applications plus précoces peuvent être faites. Des applications séquentielles peuvent être réalisées, à raison de 1 à 3 traitements à 7 à 14 jours d'intervalle selon la vigueur de la plante et sa croissance, en appliquant approximativement le même montant total du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution qu'avec une application unique à la dose recommandée.

Les applications tardives du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution par pulvérisation réduiront la hauteur de la plante mais peuvent également réduire la taille des bractées. PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution ne devrait pas être pulvérisé après la mise en oeuvre des jours courts. Généralement, ne pas appliquer le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution par pulvérisation après le 1^{er} Octobre.

Application par arrosage du pied

Employer les concentrations de 0.25 - 3 ppm pour les applications par arrosage du pied (sur la base de 120 ml par pot de 15 cm). Des applications précoces devraient être faites quand les pousses axillaires sont de 4 à 8 centimètres de long. Les applications tardives par arrosage du pied peuvent être faites sans risque après le déclenchement des jours courts pour empêcher une élongation tardive avec un effet minimal sur la taille des bractées.

- ◆ Les applications uniques aux doses les plus élevées sont très efficaces mais les applications séquentielles ont tendances à produire des plantes d'aspect plus uniforme et à limiter le risque de sur-dosage.
- ◆ Les doses et les stades d'application optimaux du PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution varient selon la variété.

Chrysanthèmes en pot

Le PICCOLO 10 XC Régulateur de Croissance des Plantes en solution peut être appliqué aux chrysanthèmes en pot par pulvérisation ou par arrosage du pied.

Utiliser des concentrations de 50 - 200 ppm pour les applications par pulvérisation et de 1 - 4 ppm pour les applications par arrosage du pied. Les applications devraient commencer quand les pousses axillaires sont de 5 à 7.5 centimètres de long. Des applications plus précoces peuvent être faites sur les variétés vigoureuses

- Pendant la pulvérisation, les applications séquentielles à dose réduite ont tendances à produire des plantes d'aspect plus uniforme.
- Si un traitement tardif est nécessaire lors de l'ébourgeonnage, l'effet sur la floraison sera minimal si le traitement se fait par arrosage du pied.
- Une application uniforme par pulvérisation ou par arrosage du pied est nécessaire pour obtenir un développement uniforme de la culture.

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House, Whittington
Worcester WR5 2RQ
United Kingdom

Distribué par:
N.M Bartlett Inc.
4509 Bartlett Road
Beamsville, Ontario
L0R 1B1
905-563-8261

Piccolo^{MC} est une marque déposée de Fine Agrochemicals Limited

PMRA 9/29/15

SPECIMEN